

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

いけだや實母散は、漢方処方「当帰芍薬散」を基本とし、これにボタンビ、コウブシ、コウカ、ケイヒを加えた生薬製剤で、婦人薬として使用され、女性特有の生理機能から生ずる手足のしびれ、冷え症、血色不良、頭痛、月経痛、月経不順に効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

【相談すること】

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振

効能・効果

肩こり、月経痛、月経不順、頭痛、手足のしびれ、のぼせ、冷え症、ヒステリー、血色不良、便秘、めまい

用法・用量

次の量を、400mlの水をもって煮て200mlに煮つめ、袋を取り去り、煎液を食前空腹時3回に分割服用する。

年齢	1日服用回数
大人(15歳以上)	3回
15歳未満	服用しないでください

成分・分量(1日量:1包12g中)

成分	含量	成分	含量
日局 カンゾウ	0.8g	日局 トウキ	1.5g
日局 ケイヒ	0.5g	日局 ビャクジュツ	1.0g
日局 コウカ	0.4g	日局 ビンロウジ	0.5g
日局 コウブシ	1.2g	日局 ブクリョク	0.5g
日局 シャクヤク	1.5g	日局 ボタンビ	1.0g
日局 センキュウ	1.5g	日局 モクツウ	1.0g
日局 チョウジ	0.2g	日局 モッコウ	0.4g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。
電話:(076)431-7017 FAX:(076)431-7013
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元: 株式会社 延寿堂
〒930-0813 富山市下赤江町1-13-3

いけだや

實

母

散

婦人良薬

池田屋安兵衛商店

第2類医薬品

いけだや 實母散

成分・分量(1日量:1包12g中)

カンゾウ…0.8g	センキュウ…1.5g	ブクリョク…0.5g
ケイヒ…0.5g	チョウジ…0.2g	ボタンビ…1.0g
コウカ…0.4g	トウキ…1.5g	モクツウ…1.0g
コウブシ…1.2g	ビャクジュツ…1.0g	モッコウ…0.4g
シャクヤク…1.5g	ビンロウジ…0.5g	

〈用法・用量〉

大人(15歳以上)1日1包

1包につき(1日分)水400mlをもって煮て200mlに煮つめ、袋を取り去り、煎液を食前空腹時3回に分服用する。

〈効能・効果〉

肩こり、月経痛、月経不順、頭痛、手足のしびれ、のぼせ、冷え症、ヒステリー、血色不良、便秘、めまい

〈注 意〉

1. 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 服用に際しては、説明文書(裏面)をよく読んでください。
 3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 脱酸素剤が入っておりますので、煎じるときに誤って入れないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

発売元 株式会社 池田屋安兵衛商店
〒930-0046 富山県富山市堤町通り1-3-5
電話(076)425-1871

製造販売元 株式会社 延寿堂
〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3

3包入(3日分)



4 957492 000406



内袋:PP
外袋:PE,PA

第2類医薬品

いけだや
肩こり・月経痛
實母散

