

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

第3類医薬品



クミアイ

婦人薬「実母散顆粒」

婦人薬

特徴

- クミアイ婦人薬「実母散顆粒」は、婦人薬として名高い、漢方処方
の「当归芍薬散」にもとづいた生薬製剤です。
- 女性特有の不快感に効果のある9種の生薬がおだやかに作用し、
もつれた糸をときほぐすように不快な症状を解消していきます。
- 血行を良くし、体を温めることにより、更年期障害の冷えをはじめ、
頭痛、腰痛、肩こりなどにも効果をあらわします。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振 |

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。










効能・効果

更年期障害、血の道症、月経不順、冷え症およびそれらに随伴する次の諸症状：月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ、血色不良、便秘、むくみ

用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|-------|---------|------|
| 15歳以上 | 1包 | 1日2回 |
| 15歳未満 | 服用しないこと | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>トウキ末…………… 300mg</p> <p>セリ科の「当帰」の根。漢方では温性強壯薬と称し、各種の婦人病に用いられます。血液の循環をよくし、各臓器の作用を高めます。</p>  | <p>センキュウ末…………… 300mg</p> <p>セリ科の「川芎」の根。強壯、補血、鎮静作用などがあり、冷え症、月経不順、めまい、頭痛などに用いられます。</p>  | <p>シャクヤク末…………… 400mg</p> <p>ボタン科の「芍薬」の根。筋肉のけいれんや緊張をほぐす作用があり、頭痛などに用いられます。</p>  |
| <p>ボタンピ末…………… 200mg</p> <p>ボタン科の「牡丹」の根の皮。頭痛・腰痛などに有効ですが、血の道症にも多く用いられます。</p>  | <p>ブクリョウ末…………… 200mg</p> <p>サルノコシカケ科の「マツホド」の外皮を削ったもの。利尿作用と鎮静作用を併せもっています。</p>  | <p>ソウジュツ末…………… 200mg</p> <p>キク科の「ホソバオケラ」の根。ブクリョウ末同様、利尿作用があります。</p>  |
| <p>ニンジン末…………… 300mg</p> <p>ウコギ科の「オタネニンジン」の根。強壯薬の代表ですが、内分泌を促進したり精神を安定させる作用もあり、更年期障害の緩和に役立ちます。</p>  | <p>紅花末…………… 100mg</p> <p>キク科の「コウカ」の花。浄血、通経薬として産前産後や血の道症、冷え症などに用いられます。</p>  | <p>ケイヒ末…………… 100mg</p> <p>クスノキ科の「桂」の枝の皮。中枢神経系の興奮を鎮静し、また血行を良くする作用もあります。</p>  |

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

製造販売者 協同薬品工業株式会社
山形県東置賜郡川西町大字西大家930