

TRADE

MARK



婦人良薬

シキネ血の薬



ひきかぜ・冷え込み

實母散

じつぼさん

人参入

第2類医薬品

〈効能・効果〉

男女四季のひきかぜ、肩のこり、手足のしびれ、冷え込み、更年期神経症、
月経不順、おりもの、こしけ、ヒステリー、血の道

第2類医薬品

品目番号:50-18

販売名:買母散 **〈成分・分量〉**本剤1包(12g)中

ケンゴシ0.225g	カンゾウ0.287g	ケイヒ0.287g	カノコソウ0.297g
シャクヤク0.553g	ソウジュツ0.572g	ボタンピ0.432g	ピンロウジ0.472g
モクツウ1.625g	ドモッコウ0.225g	チンピ0.596g	タイオウ0.225g
ニンジン0.225g	センキュウ2.213g	トウキ2.200g	チヨウジ0.300g
コウカ0.150g	フクリヨウ0.788g	コウブシ0.328g	

副作用救済制度
TEL0120-149-931**〈用法・用量〉**

15歳以上1日1包を3回に分服する。初め2回は1包に180mlの熱湯を加え振り出し、3回目は水270mlを加え半量に煎じ、温服する。

⚠〈使用上の注意〉

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳をさけること

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振

〈注意〉

- (1) 服用が適さない場合があるので、服用前に必ず医師、薬剤師、又は登録販売者に相談してください。
- (2) 服用に際しては、説明をよく読んでください。
- (3) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (4) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (5) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (6) 使用期限の過ぎたものは服用しないでください。

〈製造販売元〉 國民製薬株式会社 富山県富山市緑町2丁目4番4号

消費者相談窓口：TEL076-421-4032(平日のみ9～17時)

〈内容量〉1包…12グラム 1包入 **¥250.**

上級・PCE全薬

使用期限・ロット