



販売名：ラリアンハイ

【女性病薬】

- ◆ ラリアンハイは、更年期障害・冷え症・月経不順といった、女性特有の種々の症状を改善するために考
え出された生薬製剤です。
- ◆ ラリアンハイ中のトウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウなどは、婦人科疾患の諸症状の原因となる
血行の乱れを整え、ニンジン・カンゾウ・ケイヒ・ビャクジツ・ブクリヨウ・コウブシはトウキ・シャ
クヤク・センキュウ・ジオウなどの働きを助けて、女性に起こる更年期障害・冷え症・月経不順など種々
の症状を改善するように働きます。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた
場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること

機能・効果

更年期障害、血の道症^{a)}、月経不順、冷え症及びそれらに随伴する^{b)}次の諸症状：月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ^{c)}、血色不良、便秘、むくみ

a) 血の道症：月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことを示します。

b) 随伴する：伴って起こることを示します。

c) こしけ：おりものなどを示します。

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	3 錠	3回
11歳以上15歳未満	2 錠	
11歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤9錠(1.8g)中

カ　ン　ゾ　ウ	0.95g
ケ　イ　ヒ	0.50g
コ　ウ　ブ　シ	0.50g
ジ　オ　ウ	0.50g
シャクヤク	0.90g
センキュウ	0.75g
ト　ウ　キ	1.50g
ニ　ン　ジ　ン	0.30g
ビヤクジュツ	0.50g
ブクリヨウ	0.50g

エキス……1.25g

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

- ・本剤は灰褐色で、特異なにおいを有し、味は初め甘く後わざかに苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

ラリアンハイは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、ラリアンハイのことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

発売元

有限会社草漢堂

〒485-0044 愛知県小牧市常普請1-259

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願いします。

有限会社草漢堂

電話 0568(75)7360

受付時間 9:00~17:00

(土曜、日曜、祝日を除く)