

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

〈婦人薬〉

天恵実母散

第2類医薬品

天恵実母散は、女性特有の足腰の冷え、月経不順や血の道などの症状に働く15種類の生薬を配合した婦人薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、吐き気

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

婦人諸病、産前産後の病、血の道^注、月経不順、ヒステリー、月経痛、のぼせ、頭痛、目まい、肩のこり、冷込み、腰足の引きつり痛み、下腹痛み、感冒

〈効能・効果に関連する注意〉

注) 血の道症とは月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴ってあらわれる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

【用法・用量】

大人(15才以上)は1日1貼(包)を3回、食間に服用してください。

1回目	1貼に一合(180ml)の熱湯を加え振り出して
2回目	服用する。
3回目	水一合五勺(270ml)を加えて一合(180ml)に煎じて温服する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 15才未満は服用しないこと。
- (3) 食間とは食後2~3時間を指します。

【成分・分量】 1貼(10.5g)中

ニンジン	0.3g	ブクリョウ	1.0g	チョウジ	0.2g
トウキ	1.2g	チンピ	1.0g	コウブシ	0.5g
センキュウ	1.2g	ソウジュツ	0.8g	センコツ	0.8g
シャクヤク	1.0g	ケイヒ	0.8g	コウカ	0.2g
ポタンピ	0.8g	カンゾウ	0.6g	サフラン	0.1g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります。)
- (4) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を使用していますので、煎薬紙等に黄褐色に着色することがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

【お問い合わせ先】

本製品のお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

天恵堂製薬株式会社「お客様相談窓口」
電話 0952-97-0036
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **天恵堂製薬株式会社**
佐賀県佐賀市蓮池町蓮池234