

※2012年09月改訂

漢方煎剤 調血湯 ちょうけつとう **第2類医薬品**

【成分・分量】

日局ケイヒ 0.8g、日局オウレン 0.8g、日局ピンロウジ 0.8g
日局ビャクジュツ 0.8g、日局モッコウ 0.8g、日局センキュウ 1.5g
日局ジオウ 1.5g、日局カンゾウ 0.8g、日局シャクヤク 0.8g
日局ニンジン 0.8g、日局オウゴン 0.8g、日局ダイオウ 1.5g
日局トウキ 1.5g 全量 1袋1日分 13.20g

【効能・効果】

頭痛 めまい 冷え性 更年期障害 血の道症 月経痛

【用法及び用量】

1包1日分を600mlの水で煎じる。300mlになるまで煎じつめる。

大人は1回量100mlを、1日3回食前に温服する。

15歳未満7歳以上は大人の3分の2の量とする。

【用法及び用量に関連する注意】

小児に服用させる場合、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状の悪化や、副作用が起こりやすくなる。)

授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

【相談すること】

1、次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。

(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。

(5)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(6)次の医薬品を服用している人。

瀉下薬(下剤)

2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

軟便、下痢

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密閉して保管すること。

(2)小児の手の届かない所に保管すること。

(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因や品質が変化する。)

【お問い合わせ先】

製品についてのお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。

株式会社仁生堂(じんせいどう)

電話(054)237-1865

受付時間 9:00～19:00(土、日、祝日を除く)

株式会社仁生堂(じんせいどう)

〒422-8017 静岡県静岡市駿河区大谷二丁目5番1号

電話(054)237-1865 FAX(054)237-5340

生薬煎剂

調血湯

ちょう

けつ

とう



株式
会社

仁 生 堂
じん せい どう

第2類医薬品

第2類医薬品

調血湯 ちょうけつとう

【効能・効果】 頭痛・めまい・冷え性・更年期障害・血の道症・月経痛

【用法・用量】 大人は1袋1日分を、水600mlをもって煎じ、300mlに煎じつめ、薬袋を取り除き大人の1日量とし、100mlづつ1日3回食前に温服する。15才未満7才以上は $2/3$ とする。

【成分・分量】	日局	ケイヒ	0.80g	日局	カンソウ	0.80g
	日局	オウレン	0.80g	日局	シャクヤク	0.80g
	日局	ビンロウジ	0.80g	日局	ニンジン	0.80g
	日局	ビャクジュツ	0.80g	日局	オウゴン	0.80g
	日局	モッコウ	0.80g	日局	ダイオウ	1.50g
	日局	センキュウ	1.50g	日局	トウキ	1.50g
	日局	ジオウ	1.50g	全量	1包1日分	13.20g

- 【注意】
- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
 - (2)服用の際には、添付文書をよくお読みください。
 - (3)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

内容量 7包(7日分)

製造発売元 株式会社 **仁生堂** じんせいどう

静岡県静岡市駿河区大谷二丁目5番1号

商品に関するお問い合わせはこちらへ
株式会社 仁生堂 おくすりなんでも相談
(054) 237-1865

製造番号



www.pmda.go.jp 0120-149-931
(独)医薬品医療機器総合機構
副作用救済制度

