

## フラーリン® Q錠

第3類医薬品

## ⚠ 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位(痔出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

月経不順、月経困難、月経痛、腰痛、痔出血、脱肛<sup>a)</sup>、妊娠中の浮腫<sup>b)</sup>、痔疾、ヒステリー、更年期神経症<sup>c)</sup>

- a)脱肛：で痔のことを示します。  
b)浮腫：むくみのことを示します。  
c)更年期神経症：更年期に起こる神経症のことを示します。

## 用法・用量

次の量を随時<sup>注)</sup>、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「随時服用」とは食前・食間(食後2～3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	5 錠	3 回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

## 成分・分量

本剤15錠(3.3g)中

オウゴン0.563g・カンゾウ0.563g  
ケイヒ0.188g・シャクヤク0.75g  
シヨウキョウ0.188g・センキュウ0.563g  
タイソウ0.563g・タクシャ0.75g  
トウキ0.75g・ビャクジュツ0.563g  
ブクリョウ0.563g

エキス…2.68mL(固形物として0.75g)

カンゾウ末…0.375g  
ケイヒ末…0.375g  
センキュウ末…0.225g  
ビャクジュツ末…0.525g  
ブクリョウ末…0.75g

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖を含有する。

- ・本剤は淡黄褐色で、特異なおいを有し、味はわずかに苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

フラーリンQ錠は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号