

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください

和漢薬配合 血之道薬 女性保健薬

本剤は漢方処方に基づいてつくられた和漢薬配合の婦人薬で、更年期障害、血の道症、生理不順や、冷え症等によって起きる不快な症状等に効果がありますので、若い人からお年よりまで、幅広く飲んでいただける婦人薬です。

特 徴

1. 漢方処方に基づいて考えられた和漢薬配合の婦人薬（煎じ薬）です。
2. 婦人特有の血の道の諸症状をやわらげる効果があります。
3. 婦人に多い体の冷え込みは健康の大敵です。この冷え症に効果があります。
4. 1～2回目にはふりだし、3回目は煎じて温服していただくとより効果があります。

！ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

血の道、産前産後、冷え込み、ヒステリー、ひきかぜ

用法・用量

大人1日1貼を3回に服用、初め2回は1貼りに1合の熱湯を加え振出し、3回目は水1合5勺を加え半量に煎じ温服してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法用量をお守りください。

成分・分量 1日量(1貼中)

成 分	分 量	成 分	分 量
川 芎 (センキュウ)	2.2 g	甘 草 (カンゾウ)	0.4 g
当 帰 (トウキ)	2.2 g	芍 薬 (シャクヤク)	0.4 g
牽 牛 子 (ケンゴシ)	0.3 g	香 附 子 (コウブシ)	0.65g
蒼 朮 (ソウジュツ)	1.4 g	桂 皮 (ケイヒ)	0.5 g
川 骨 (センコツ)	1.4 g	牡 丹 皮 (ボタンピ)	0.2 g
茯 苓 (フクリョウ)	0.7 g	吉 草 根 (カノコソウ)	0.7 g

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。

製造販売元

日本医薬品製造株式会社

奈良県御所市古瀬18番地
お問い合わせ先 TEL0745-67-0015