

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



腔カンジダの再発治療薬

第1類医薬品

メンソレータム® フレディCC1

腔錠

※本剤の使用は、以前に医師から腔カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限ります。

腔カンジダとは？

腔カンジダとは、カンジダという真菌（カビの仲間）によって起こる炎症です。女性性器の感染症の中では、よくみられる疾患ですが、適切な治療を行うことが大切です。

腔カンジダの典型的な症状

腔カンジダにかかると、おりものの見た目や量に変化（おかゆ（カッテージチーズ）状や白く濁った酒かす状）がおこり、外陰部に発疹（発赤、はれた感じ等）を伴うかゆみが生じます。



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないでください。

- （1）以前に医師から、腔カンジダの診断・治療を受けたことがない人。
- （2）腔カンジダの再発を繰り返している人。（2ヶ月以内に1回又は6ヶ月以内に2回以上）
（短期間に繰り返し再発する場合は、糖尿病など他の疾患の可能性も考えられる）
- （3）腔カンジダの再発かどうかよくわからない人。（おりものが、おかゆ（カッテージチーズ）状や白く濁った酒かす状ではない、嫌なにおいがあるなどの場合、他の疾患の可能性が考えられる）
- （4）発熱又は悪寒がある人。
- （5）吐き気又は嘔吐がある人。
- （6）下腹部に痛みがある人。
- （7）不規則な、又は異常な出血、血の混じったおりものがある人。
- （8）腔又は外陰部に潰瘍、水膨れ又は痛みがある人。
- （9）排尿痛がある人、又は排尿困難な人。
- （10）次の診断を受けた人。 糖尿病
- （11）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （12）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （13）60歳以上の高齢者又は15歳未満の小児。

2. 本剤を使用後6日間は、次のいずれの医薬品も外陰部に使用しないでください。 カンジダ治療薬以外の外皮用薬

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）授乳中の人。
- （3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

関係部位	症 状
腔	疼痛（ずきずきする痛み）、腫脹感（はれた感じ）、発赤、刺激感、かゆみ、熱感

3. 3日間経過しても、症状の改善がみられないか、6日間経過しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けてください。

効能・効果

腔カンジダの再発。
（以前に医師から、腔カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。）

成分・分量（1錠中）

有効成分	配合量
イソコナゾール硝酸塩	600mg

添加物として、乳糖水和物、セルロース、カルメロース、ステアリン酸Mgを含有する。

用法・用量

本剤は、1回の使用で効果があります。
次の量を腔深部に挿入してください。

年 齢	1 回 量
成人(15歳以上60歳未満)	1錠(できれば就寝前)
15歳未満及び60歳以上	使用しないこと

ただし、3日間経過しても症状の改善がみられないか、6日間経過しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けてください。

用法及び用量に関連する注意

- (1)本剤は1回の使用で十分な効果があるように設計されています。1回投与すると投与した薬剤が腔内に留まって徐々に効きますので、カンジダ用の腔錠或いは腔坐剤を追加使用しないでください。
 - (2)この薬は腔にのみ使用し、飲まないでください。
もし、誤って飲んでしまった場合は、すぐに医師の診療を受けてください。
 - (3)生理中は使用しないでください。使用後6日以内に生理になった場合は、治癒等の確認が必要であることから、医師の診療を受けてください。
 - (4)使用後6日以内に、腔錠が溶けずに、挿入したそのままの形や大きさに出てきたときには、自己判断で腔錠を追加挿入せず、医師又は薬剤師にご相談ください。
- ※本剤は腔内に留まって効果を発揮し、徐々に体外に排泄されるため、白い小さなかたまりやペースト状のものが出てくることがあります。

使い方

できれば夜、就寝前に使用してください。


① 準備をする

手指を石けんできれいに洗ってください。
錠剤をシートから取り出してください。



② 姿勢を整える


体の力を抜いてリラックスします。右図のように片ひざを立てる姿勢がおすすめです。



③ 手指で腔錠を挿入する

錠剤を指先で、腔の一番深いところに挿入してください。
挿入後は、手を石けんできれいに洗ってください。

アプリケーター等は使用しないでください。アプリケーターの使用をご希望の方は「メンソレータムフレディCC1A」をご使用ください。



以上で、再発した腔カンジダに対する治療は終わりです

しかし、使用後6日間は、カンジダ菌が腔内に残っているので、性交を避けるなど生活上の注意をまもりましょう。

- 3日後:症状が改善しない場合は、医師の診療を受けましょう
- 6日後:症状が消失しない場合は、医師の診療を受けましょう

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

生活上の注意

- (1)腔カンジダを再発した場合には、パートナーに感染している可能性があるため、腔カンジダに感染した旨を伝え、パートナーの方は陰部のかゆみ、発赤等の不快症状があれば、すぐに医師の診療を受けてください。
- (2)パートナーへの感染を避けるため、本剤を使用後6日間は性行為を避けましょう。
- (3)本剤を使用後6日間は、患部への刺激を避けるため、殺精子剤は使用しないようにしましょう。
- (4)薬剤の効果を維持するため、自分で腔内を洗うことは控えましょう。
- (5)入浴時は石けんの刺激を避けるために、外陰部は石けんで洗わず、お湯だけで軽く洗う程度にしましょう。
- (6)カンジダ菌は、温度や湿度の高い状態で繁殖しやすいため、できるだけ乾燥した状態を保つようにすることが大切です。以下の点に気を付けましょう。●入浴、水泳後等は、腔の外側は十分乾かしましょう。濡れた水着などはできるだけ早く着替えましょう。●おりものシートなどの衛生用品を使用される場合は、こまめに交換しましょう。●下着は、通気性のよい綿製品などを用いるようにしましょう。
- (7)下着やタオルは毎日清潔なものを着用し、タオルなどは感染を避けるため、家族と共用しないようにしましょう。
- (8)カンジダ菌は腸にも常在している菌です。トイレの後には腸からの感染を避けるため、前から後ろにふきましょ。
- (9)かゆみがあっても、外陰部をかかないようにしましょう。かくと、刺激がひどくなったり、感染が広がる可能性があります。

お問合せ先

コミュニケーションコール

0120-280-610

受付時間/9:00~17:00(土、日、祝除く)

※女性スタッフが対応いたします。

Rohto

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1