

アレルギーによるかゆみ・湿疹に  
飲む かゆみ・炎症止め

抗アレルギー薬

## アスミンガードAZ

第2類医薬品

## ●皮ふのアレルギー症状に

抗アレルギー作用と抗ヒスタミン作用を併せもつ「アゼラスチン塩酸塩」配合。  
かゆい湿疹・かぶれ、じんましんなど、皮ふのアレルギー症状に飲んで効きます。

## ●1回1錠で12時間効果が持続

「日中の我慢できないかゆみ・湿疹には朝の外出前に服用」  
「かゆくて眠れない、寝ているときに搔きむしまるかゆみ・湿疹には就寝前に服用」など、あらゆるシーンに対応できます。

## ●広い範囲の湿疹、じんましんによる皮ふのかゆみ・炎症に効く

アレルギーは疲れやストレス、温度変化など様々な刺激や要因で発生し、炎症を伴ったつらいかゆみが広がっていきます。内服薬なので、塗り薬では対処しきれない体全体のアレルギー症状に効きます。

## ⚠ 使用上の注意

## 🚫 してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる]

## ①次の人は服用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)15歳未満の小児
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人

## ②本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のアレルギー用薬(皮ふ疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬)

## ③服用前後は飲酒しないでください。

④服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります。)

## ⑤授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

## ⑥長期連用しないでください。



## 相談すること

## ①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)高齢者
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4)アトピー性皮膚炎、又はアトピー素因があると診断を受けた人
- (5)気管支ぜんそくの診断を受けた人
- (6)発熱やせき、黄色で粘りのある鼻みすなどのかぜ症状がある人
- (7)皮ふの症状が「じんましん、湿疹・かぶれ」によるものか、虫さされや化膿等他の原因によるものかわからない人  
又は、鼻炎の場合でアレルギー性鼻炎か、かぜによる鼻炎かわからない人

## ②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内及び口周囲のあれ、食欲不振、胸やけ、胃部不快感、腹痛
精神神経系	倦怠感、めまい、頭痛、手足のしびれ
循 環 器	動悸
呼 吸 器	息苦しさ
泌 尿 器	頻尿、排尿困難、血尿

関係部位	症 状
肝 臓	全身のだるさ、皮ふや白目が黄色くなる
そ の 他	顔面のほてり、鼻乾燥、浮腫、月経異常

- ③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、便秘、下痢、眠気
- ④じんましん、湿疹・かぶれなどの皮ふの症状の場合で、症状の軽減がみられるが繰り返し症状が起こるなど1週間以上症状が継続する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ⑤鼻炎の症状の場合で2週間以上服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して服用してください。

## 効能・効果

- じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮ふのはれ、かゆみ
- 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり

## 用法・用量

次の量を朝食後及び就寝前に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	2回
小児(15歳未満)	X 服用しないこと	

### [用法・用量に関する注意]

- (1)鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮ふの症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善がみられない場合には服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (2)早めにのみこんでください。長く口中にとどめると苦味を感じことがあります。これは成分自身の苦味によるものです。また、服用後にも苦味を感じことがあります。
- (3)花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
- (4)錠剤の取り出し方  
錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。(誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



## 成分・分量と働き

成人1日量2錠中に以下の成分を含みます。

成 分	含 量	働 き
アゼラスチン塩酸塩	2mg	アレルギー症状の原因となるヒスタミンやロイコトリエンなどの作用を抑えて、皮ふや鼻のアレルギー症状を緩和します。

### [添加物]

乳糖水和物、バレイショデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

## 保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### お問い合わせ先

お問い合わせのお店、又は下記にお願いいたします。

薬王製薬株式会社 お客様相談室 電話 0744-33-8855  
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)