

第2類医薬品

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう保管してください。

切傷・すり傷に

ワーム

- ◆ワームは、すぐれた殺菌消毒作用を有し、創傷面の症状悪化を防ぐアクリノールに局所の神経を麻痺して痛みをしずめるリドカイン、創傷面に働いて消炎作用をあらわす酸化亜鉛、正常な皮膚組織ができるのを促す作用とともに炎症をしずめ傷の治りを早めるアラントインをバランスよく配合した外用薬です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
 - 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効 能

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

1日1～数回、患部に塗布または貼布する。

<用法・用量に関する注意>

- 定められた用法を守ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 本剤は外用にのみ使用してください。

成分・作用 (100g中)

成分	分量	作用
アクリノール	0.1 g	創傷面で殺菌作用を発揮しますが、刺激はほとんどありません。
リドカイン	1.0 g	患部の痛みをしずめます。
酸化亜鉛	4.0 g	創傷面を外からの刺激から保護するとともに、患部を乾かします。
アラントイン	1.0 g	皮膚の再生を促進し、治りを早めます。

添加物としてオリブ油、パラフィン、ワセリン、L-メントール、香料を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 外箱に表示してある配置期限内に使用してください。



本品についてのお問い合わせは下記に
お願いします。

池田薬品工業株式会社 お客様相談室
電話 (076) 472-3311 (大代表)
受付時間 平日 8:10~17:00



製造販売元

池田薬品工業株式会社

富山県中新川郡上市町若杉12