

P

P

〈用法用量に関連する注意〉

- (1)用法用量を厳守してください。
- (2)顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕

過酸化水素（H₂O₂）2.5～3.5 w/v%を含有します。

添加物：フェナセチン、リン酸

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない冷所（30℃以下）に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがありますので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけてください。

〈貯法〉

気密容器。遮光して30℃以下で保存。

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造
番号
使用
期限

外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

日本薬局方

オキシドール

500mL

Oxydol



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

きずの消毒・洗浄に

使用に際しては、説明書きをよく読んで下さい。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)患部が広範囲の人。
- (4)深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能効果〕 きずの消毒・洗浄

〔用法用量〕

そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗ってください。

第3類医薬品

日本薬局方

オキシドール

～30

つぶして廃棄
しやすい
減容ボトル



キャップ：PP
ボトル：PE
外装フィルム：PP



Oxydol 日本薬局方 オキシドール

外用殺菌消毒薬

・きずの消毒、洗浄に

第3類医薬品

Oxydol (Hydrogen Peroxide)

Disinfectant containing approximately 3% hydrogen peroxide.
Use to disinfect and clean cuts and scratches.

使用に際しては、説明書をよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能効果〕

きずの消毒・洗浄

〔用法用量〕

そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗ってください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(右側面へ続く)

F

(ノ 左側面より続く)

(4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(5) 外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕

過酸化水素 (H₂O₂) 2.5～3.5 w/v% を含有します。

添加物：フェナセチン、リン酸

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない冷所 (30℃以下) に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(5) 保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがありますので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけてください。

〈貯法〉

気密容器。遮光して30℃以下で保存。

※この商品は純マツキヨコカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

製造販売元：健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5822

受付時間 9:00～17:00

(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

