

殺菌・消毒に

100mL Dilute Iodine Tincture

希ヨドチン

日本薬局方
外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

d
P

第3類医薬品

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

希ヨドチン

Dilute Iodine
Tincture

100mL

殺菌・消毒に

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

紙箱

製造番号
使用期限

1



函箱用紙

各製薬局

P

第3類医薬品

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

希ヨドチン

Dilute Iodine
Tincture

100mL

殺菌・消毒に

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

日本薬局方 希ヨドチンキ

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
粘膜(口唇等)、口の中、目の周囲、化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、次の医薬品を使用しないでください
マキキュロクロム液
4. 広範囲又は長期連用しないでください

■ 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感、水ぶくれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

2401

01

CX-8

1201