

色がつかない きず薬

外傷救急薬

ケンエーシロジン

切傷、すり傷、靴ずれ、虫さされ、かゆみ

75mL 外用専用

第2類医薬品

【効能効果】切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、虫さされ、かゆみ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

【成分分量】100mL中 ベンゼトニウム塩化物 100mg ジブカイン塩酸塩 100mg ナファゾリン塩酸塩 100mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 200mg



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

【使用上の注意】

【相談すること】1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 医師の治療を受けている人 ●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ●患部が広範囲の人 ●深い傷やひどいやけどの人
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【用法用量】症状に応じ、1日数回患部に噴霧又は脱脂綿、ガーゼ等に浸して塗布してください。【用法に関する注意】●用法を厳守してください。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。●目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。●外用にのみ使用してください。【保管及び取扱い上の注意】●直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

●他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)



副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

スプレー：PP
ボトル：PE
外装フィルム：PP

製造番号・使用期限は容器底面に記載

4987286301945