

色がつかない  
きず薬

外傷救急薬

ケンエーシロチン

切傷、すり傷、靴ずれ、虫さされ、かゆみ

75mL 外用専用

第2類医薬品

〔効能効果〕切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、虫さされ、かゆみ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒  
〔成分分量〕100 mL中 ベンゼトニウム塩化物 100 mg ジブカイン塩酸塩 100 mg ナファゾリン塩酸塩 100 mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 200 mg



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

### 〔使用上の注意〕

〔相談すること〕1. 次の人は使用前に医

師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●医師の治療を受けている人●薬などによりアレルギー

ギ一症状を起こしたことがある人●患部が広範囲の人●

深い傷やひどいやけどの人 2. 使用后、次の症状があらわれ

た場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔用法用量〕症状に応じ、1日数回患部に噴霧又は脱

脂綿、ガーゼ等に浸して塗布してください〔用法に關

連する注意〕●用法を厳守してください●小児に使用

させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ

てください●目に入らないように注意してください

万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で

洗ってください なお、症状が重い場合には、眼科医

の診療を受けてください●外用にのみ使用してくださ

い〔保管及び取扱い上の注意〕●直射日光の当たら

ない涼しい所に密栓して保管してください●小児の手

の届かない所に保管してください

●他の容器に入れ替えないでくだ

さい（誤用の原因になったり品質

が変わることがあります）



副作用被害救済制度

☎0120-149-931

スプレー：PP

ボトル：PE

外装フィルム：PP



製造番号・使用期限は容器底面に記載

matsu  
kiyo

Antiseptic Spray

色がつかない

きず消毒薬

外傷救急薬

【効能効果】切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、虫さされ、かゆみ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

【成分分量】100mL中 ベンゼトニウム塩化物100mg、ジブカイン塩酸塩100mg、ナファゾリン塩酸塩100mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩200mg

外用専用

殺菌  
消毒

切傷  
すり傷  
靴ずれ  
虫さされ  
かゆみ

第2類医薬品

販売名：ケンエーシロチン

製造販売元

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5822

Colorless antiseptic  
for cuts and scratches

〔使用上の注意〕

〔相談すること〕 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください●医師の治療を受けている人●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人●患部が広範囲の人●深い傷やひどいやけどの人  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 関係部位：皮膚 症状：発疹・発赤、かゆみ、はれ 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください〔用法用量〕症状に応じ、1日数回患部に噴霧又は脱脂綿、ガーゼ等に浸して塗布してください<用法に関連する注意> ●用法を厳守してください●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください●目に入らないように注意してください 万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください●外用にのみ使用してください〔保管及び取扱い上の注意〕●直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください●小児の手の届かない所に保管してください●他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

税 控除 対象

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。