ラビジェル® 第3類医薬品

■最初に使用する時に



キャップ①を固定し、ポンプカバー②を矢印の方向に回すと、ポンプが上がります。液が出るまで数回押してください。

■手指消毒法



①適量を手のひらに取ります。



②手指全体にすり込むよう伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。

折りたたんで廃棄しやすいボトルを採用

折り目

目安
400
300
200
100

開封日
年　月　日

第3類医薬品

とりかえの目安
年　月　日

速乾性すり込み式手指消毒剤

ラビジェル®

アルコール類＊水溶性＊危険等級Ⅱ

RABIGEL®

火気厳禁



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号　06(6231)5822

ラビジェル® 第3類医薬品

⚠使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)損傷のある皮ふ。

(2)目の周囲、粘膜等。

相談すること

1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ

〔効能効果〕

手指の殺菌・消毒

〔用法用量〕

適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。

〈用法用量に関連する注意〉

(1)用法用量を厳守してください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(右側面へ続く↗)

折り目

ラビジェル® 第3類医薬品

(↗左側面より続く)

C

(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(4)外用にのみ使用してください。

(5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。

(6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

〔組成性状〕

有効成分	エタノール(C_2H_6O)　76.9～81.4 vol%
添加物	リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース
性　状	無色澄明の粘性の液です。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)火気に近づけないでください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(6)薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

〈貯法〉

気密容器。火気を避けて室温保存。

Ⓡ登録商標

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)