

2013年4月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

殺菌・消毒薬

日本薬局方 **ベンザルコニウム塩化物液**
ベンザルコニウム塩化物の10W/V%水溶液

第3類医薬品

(逆性石けん液)

スタゾール 20L

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

手指・創傷面の殺菌・消毒、口腔内の殺菌・消毒

用法及び用量

本品を次のように水で希釈して、塗布または洗浄する。

- 手指の殺菌・消毒：100～200倍
(ベンザルコニウム塩化物として0.05～0.1%)
- 創傷面の殺菌・消毒：400～1000倍
(ベンザルコニウム塩化物として0.01～0.025%)
- 含嗽の場合：1000～2000倍
(ベンザルコニウム塩化物として0.005～0.01%)

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

お問い合わせ先 国産薬品工業株式会社
お客様相談室 ☎0120-313-430
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度
☎0120-149-931

製造販売元
国産薬品工業株式会社
岐阜市秋沢370番2



製造番号

使用期限

13041