

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

本剤にステロイド成分は配合されていません。

〔成分・分量〕（1g中）

ベンゼトニウム塩化物・・・・・・・・・・0.1mg

アラントイン・・・・・・・・・・2mg

グリチルリチン酸二カリウム・・・・・・・・・・1mg

添加物として、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、ヒアルロン酸Na、ポリオキシエチレンセチルエーテル、クエン酸、クエン酸Na、グリシン、パラベン、エタノールを含有します。

〔適応症〕

とびひ・おでき等の感染皮膚面の消毒、創傷面の殺菌・消毒、かき傷、切傷、すり傷、さし傷、靴ずれ

〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 患部を清潔にした後、塗布してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

〔保管および取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります）。

お問い合わせ先

発売元 資生堂薬品株式会社 お客様窓口 03-3573-6673

受付時間 9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 株式会社 資生堂 東京都中央区銀座7-5-5

SHISEIDO