

2012年1月（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明事項を必ずお読みください。

販売名:スキネード射泡

▲ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に直接塗布又はガーゼ、脱脂綿等に泡状にのせ塗布する

<用法・用量に関連する注意>

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- 4) 外用にのみ使用し、内服しないこと

キズの殺菌・消毒
やさしくキズを包む



第2類医薬品

スキネード射泡

Skin Aid



スキネード射泡 殺菌消毒剤 外用専用/80mL

◎ 容器の使い方◎

キャップをはずし、ポンプを押すと、薬液が泡状に出ます。

【成分・分量】 本品100mL中

- ジブカイン塩酸塩……………100mg
- ナファゾリン塩酸塩……………100mg
- クロルフェニラミンマレイン酸塩…200mg
- ベンザルコニウム塩化物……………100mg

添加物: エドト酸ナトリウム水和物、ラウリン酸ジエタノールアミド、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

- 1) 小児の手の届かない所に保管すること
- 2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

製造番号

使用期限



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祭日除く)



ポンプ
キャップ
ボトル
外装フィルム

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

B12-FL



4 975175 011587

2012年1月(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明事項を必ずお読みください。

販売名：スキネード射泡

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回、適量を患部に直接塗布又はガーゼ、脱脂綿等に泡状にのせ塗布する

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守すること
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- 外用にのみ使用し、内服しないこと

K-select

アワのきず薬

殺菌・消毒

**きずにやさしい
泡タイプ。**

80mL

第2類医薬品

- 持ち運びに便利
オーバーキャップ
- ノンガスタイプで
地球にやさしい

スキネード射泡 殺菌消毒剤 外用専用/80mL

◎容器の使い方◎

キャップをはずし、ポンプを押すと、薬液が泡状にできます。

成分・分量 本品100mL中

ジブカイン塩酸塩……………100mg
 ナフソリン塩酸塩……………100mg
 クロルフェニラミンマレイン酸塩…200mg
 ベンザルコニウム塩化物……………100mg

添加物:エデト酸ナトリウム水和物、ラウリン酸ジエタノールアミド、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手の届かない所に保管すること
- 2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと



製造番号

使用期限



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日、祝日除く)



ポンプ
キャップ
ポ
トル
外装フィルム

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

E13-FL