

本品の使用前に、この説明事項を必ずお読みください

平成 27 年 3 月作成

第 3 類医薬品

泡ジーケア

(情報は小箱に直接記載)

⚠ [使用上の注意]

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6 日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

[用法・用量]

1 日数回、適量を患部に直接塗布又はガーゼ、脱脂綿等に泡状にのせ塗布する。

<用法・用量に関連する注意>

- ① 定められた用法・用量を厳守すること。
- ② 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- ③ 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- ④ 外用にのみ使用し、内服しないこと

[使用法]



<切傷、すり傷等の小さな傷に>

- ① 傷面を清潔にします。
- ② 泡ジーケアの泡をガーゼ等の上に出します。
- ③ 患部に軽く塗布して、残った泡を数十秒後に拭き取ります。

[成分・分量]本品(100mL)中

クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・200mg

アラントイン・・・・・・・・・・・・・・200mg


ベンザルコニウム塩化物・・・・・・・・100mg

添加物:ラウリン酸ジエタノールアミド、エデト酸 Na 水和物、エタノール

[保管及び取扱い上の注意]

- ①小児の手の届かない所に保管すること
- ②直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- ③誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと
- ④使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

[包装] 80ml × 1 個入

発売元  ムネ製薬株式会社
兵庫県淡路市尾崎 859 電話：0120-85-0107
お客様窓口
受付時間 8：30～17：00（土日祝を除く）
<http://www.mune-seiyaku.co.jp>

製造販売元 大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

副作用被害救済制度のお問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
--



(約200プッシュ) 80mL

泡タイプ

しみにくい殺菌消毒薬

お役立ち情報



※イラストはイメージです。

販売名

泡ジーケア 内容量:80mL

第3類医薬品

成分・分量

本品100mL中
クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… 200mg
アラントイン…………… 200mg
ベンザルコニウム塩化物…………… 100mg
添加物: ラウリン酸ジエタノールアミド、エデト酸Na水和物、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- ①小児の手の届かない所に保管すること
- ②直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- ③誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- ④使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

発売元 **M M 製薬株式会社**
兵庫県淡路市尾崎859 電話:0120-85-0107

お客様窓口

受付時間 8:30~17:00(土日祝を除く)
<http://www.mune-seiyaku.co.jp>



製造販売元

大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

副作用被害救済制度のお問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



4 987388 418015

第3類医薬品

痔で痛む方

温水洗浄で
しみる方

お尻を清潔に
したい方

排便後

拭くのがつらい 痛とおしりを

スキン! ヒリヒリ!

泡が刺激を
軽減



トイレト
ペーパーに
のせるだけ

殺菌・消毒薬
泡ジーケア

80mL
(約200プッシュ)

2015年2月(初版)

F20-T5

(本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください)

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 患部が広範囲の人
(4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量

1日回数、適量を患部に直接塗布又はガーゼ、脱脂綿等に泡状にのせ塗布する。

用法・用量に関連する注意

- ①定められた用法・用量を厳守すること
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- ③目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- ④外用にのみ使用し、内服しないこと

しみにくい やさしい 泡の殺菌 消毒薬

炎症・かゆみを
抑える

傷の修復を助ける

殺菌・消毒薬
泡ジーケア

第3類医薬品

80mL
(約200プッシュ)

※イラストはイメージです。

使用期限

製造番号

