



第3類
医薬品

日本薬局方

オキシドール

Oxydol

3%過酸化水素水



販売元 オールジャパンドラッグ株式会社

製造販売元 大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

2012年1月(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明事項を必ずお読みください。

販売名:オキシドール「TOX」



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

傷の消毒、洗浄

用法・用量

そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗う

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 外用にのみ使用し、内服しないこと
- 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- 4) 顔面など皮膚の敏感な箇所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始すること
- 5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること

成分・分量

本品は過酸化水素2.5～3.5w/v%を含む
添加物:フェナセチン、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手の届かないところに保管すること
- 2) 直射日光の当たらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 使用後は密栓すること
- 4) 保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけること
- 5) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

E12-TS

日本薬局方
オキシドール
Oxydol
3%_v%過酸化水素水



販売元 オールジャパンドラッグ株式会社
製造販売元 大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

副作用被害救済制度

0120-149-931

2012年1月(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明事項を必ずお読みください。

販売名:オキシドール「TOX」

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5～6日間使用しても症状がよならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

傷の消毒、洗浄

用法・用量

そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗う

〈用法・用量に関連する注意〉


- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 外用にのみ使用し、内服しないこと
- 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- 4) 顔面など皮膚の敏感な箇所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始すること
- 5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること

成分・分量

本品は過酸化水素2.5～3.5w/v%を含む
添加物:フェナセチン、エタノール


保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手の届かないところに保管すること
- 2) 直射日光の当たらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 使用後は密栓すること
- 4) 保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけること
- 5) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと



「キャップのあけかた」
指の腹で押し上げるように開けて下さい。
「注意」
爪をかけて持ち上げると爪を傷つけるおそれがあります。

「環境を配慮した、たためるボトル採用」



- ① ボトルの真ん中を両手で持ち、つぶす。
- ② しっかりと押さえ込んだ後、空気が入らないようにキャップをしめ、廃棄する。

E12-TS