

第3類医薬品

傷口をソフトに包んで化膿を防ぐ

〈殺菌消毒薬〉

タマガワ新リバガーゼA

SHIN-RIBAGAUZE A

使用方法



ガーゼを患部に貼付して 上から油紙をあて 軽く包帯で固定する

タマガワエーザイ

第3類医薬品



外用
ガーゼサイズ: 8cm×5cm

50枚入

紙 外箱

ビンセット袋

販売名: タマガワ新リバガーゼA

第3類医薬品

効能・効果 切傷・擦過傷(すり傷)・化膿性創傷
成分・分量 1.2g中 アクリノール水和物0.4%液...1.0g
ガーゼ...0.2g 添加物 グリセリン

用法・用量 ビンセットでガーゼを取り、患部に貼付して油紙を当て、軽くホータイをして下さい。1日1回交換して下さい。
用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 患部を清潔にし、ガーゼ部分を汚さないように注意して使用すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 衣類に付着すると黄色に着色し、脱色しにくいので、注意すること。
- (5) 使用期限(箱裏面・ボトル底面に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

開封日



4 901957 020164

使用期限

製造番号

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

製造販売元
玉川衛材株式会社
東京都千代田区
富士見1-8-19

玉川衛材(株) お客様相談窓口
TEL. 03-4334-8857
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

RA1-T

副作用被害救済制度
TEL. 0120-149-931