

Hapycem

色のつかない

きず薬

液体の色/透明 80mL

殺菌消毒薬 Antiseptic 第2類医薬品

販売名: デシンA [殺菌消毒薬 外用]

効能・効果 きり傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布するか、又は本液を湿したガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆う。

成分: 本品80mL中 ペンザルコニウム塩化物 80mg
塩酸リドカイン 800mg ナファゾリン塩酸塩 80mg
クロルフェニルミンマリン酸塩 160mg 添加物: 香料

使用前にこの説明文書を必ず読むこと

使用上の注意 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人 (4) 深い傷やひどいやけどの人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚: 発疹・発赤、かゆみ、はれ 3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になりたり品質が変わる) (4) 使用期限 (底面に記載) をすぎた製品は使用しないこと

用法に関する注意 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (2) 目に入らないように注意すること、万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (3) 外用にのみ使用すること

4 901957 030446

ボトル キャップ、ノズル 外装フィルム

本品は透明フィルムで包装しています。 KD02-AH-SP

副作用報告済製品 0120(149)931

製造販売元 玉川衛材株式会社

玉川衛材(株)お客様相談窓口 TEL.03-4334-8857

東京都千代田区富士見1-8-19 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)