



**キズの殺菌消毒に**

**マキロン<sup>®</sup>S**

**ジェット & スプレー**

**皮膚の修復成分配合**

**第3類医薬品**

殺菌消毒薬  
外用専用

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、  
創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の  
肛門の殺菌・消毒

**キズ口を清潔にする  
ダブルスプレー方式**

第一三共ヘルスケア

**第3類  
医薬品**

色がつかない殺菌消毒薬(ダブルスプレー方式)  
**マキロン<sup>s</sup>ジェット&スプレー**  
使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。

本品は透明フィルムで  
包装しています。

**△ 使用上の注意**  **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人 (4) 深い傷やひどいやけどの人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚:発疹・発赤、かゆみ、はれ 3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

[成分・分量] 100mL中 ベンゼトニウム塩化物・0.1g  
アラントイン・0.2g、クロルフェニラミンマレイン酸塩・  
0.2g 添加物:エタノール、pH調節剤、香料、チモール、  
l-メントール、窒素

[使用法] 1日数回、患部に適量を噴射又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。〈使用法に関連する注意〉(1) 使用法を厳守すること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4) 外用にのみ使用すること。(5) 顔面、粘膜等には直接噴射しないこと。

[保管及び取扱い上の注意] (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(4) 捨てるときは、屋外で噴射音が消えるまでガスを抜くこと。

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

使用期限、製造番号は缶底に記載。

[お問い合わせ先] 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
0120-337-336 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標

販売元:第一三共ヘルスケア株式会社 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元:東亜薬品株式会社 富山県富山市水橋開発277番10

## 高温に注意

加圧されている製品のため、下記の注意を守ること。  
1. 温度が40度以上となるとところに置かないこと。  
2. 火の中に入れてはいけないこと。3. 使い切って捨てること。  
窒素使用

F M