

使用量
目安

開封日 年 月 日 とりかえ
の目安 年 月 日

第3類医薬品



製造番号

使用期限

飲めません

火気注意

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

残量
目安

開封日
年
月
日

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。

エタノールを有効成分とする速乾性のジェル状手指消毒剤です。
ジェル状なので、液だれしにくく、手荒れにも配慮しております。
手にとってからほどよく広がり、手になじみます。

△ 使用上の注意

（してはいけないこと）

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと
手指の皮膚の治療を受けている人。
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。
(局所刺激作用がある。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こし
たことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性があるので、直ちに使用を中止
し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

● 効能・効果

手指の殺菌・消毒

● 用法・用量

適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。
（目安としてポンプ1押し）の量）

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、
目に入った場合には、すぐに水又は
ぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の
診察を受けること。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (5) 本剤は製品の性質上、ポンプの先の液
が固まる場合があります。このような
場合にはこの固まりを取り除いてから
使用すること。

● 成分・分量

100mL中 日局エタノール 83mL
及び添加物としてカルボキシビニルポリ
マー、低強度カテンテン末、ヒドロキシプロ
ピルセルロース、ジイソプロパノールアミン
、プロピレングリコール、トコフェロール
酢酸エステル、合成スクワラン 含有。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管
すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用
の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため
床にこぼれると変色すると変色する場合がある
ので注意すること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しない
こと。

火気厳禁

第4類
アルコール類
（エタノール）
危険等級II
水溶性



ポンプ：PP、PE
ボトル：PE
ラベル：PET

【お問合せ先】

丸石製薬株式会社 学術情報グループ
大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL. 0120-014-561

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931（フリーダイヤル）

