

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起したことがある人。(3) 患部が広範囲の人。(4) 深い傷やひどいやけどの人。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹、発赤、かゆみ、はれ 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること【取扱以上の注意】石鹸等(クレンジールその他アルカリ性のもの)の併用を避ける【成分・分量】60mL中 ジブカイン塩酸塩60mg エドリン塩酸塩60mg クロルフェニラミン塩酸塩120mg ベンゼトニウム塩化物120mg【効能・効果】擦り傷、切り傷、かき傷、靴ずれ【用法・用量】1日2～3回塗布する【用法・用量に関する注意】(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3) 外用にのみ使用する。【保管及び取扱以上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)



副作用救済制度 ☎0120-149-931

13-7-D

マキタン®

殺菌消毒薬

第2類医薬品



60mL

色がつかない外傷救急薬

製造販売元



明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地

お客様相談室 ☎0120-53-3451
9:00~17:00 (土、日、祝日、特定休日を除く)



容器
キヤップ
外装フィルム