

第2類医薬品

殺菌消毒薬

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

MEDICARE®

メディケア®シリーズ


切り傷、すり傷に

(販売名) サイレンQ

サイレンQとは

サイレンQは手先等の切り傷、すり傷の痛みを抑え、創傷を治療します。ジブカイン塩酸塩が局所麻酔作用により痛みを鎮めます。クロルフェニラミンマレイン酸塩が抗ヒスタミン作用で炎症を和らげます。ナファゾリン塩酸塩が止血作用により出血を抑え、ベンゼトニウム塩化物が殺菌・消毒作用により、化膿を防ぎます。無色透明の液体タイプの医薬品です。

4種の有効成分で



⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人

(裏面もお読みください)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回、患部に噴霧又はガーゼ、脱脂綿に浸して塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。(内服しないでください。)

成分・分量

(10mL中)

成分	含量	はたらき
ジブカイン塩酸塩	10mg	局所麻酔作用で痛みを和らげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	20mg	抗ヒスタミン作用で、痒みや腫れを抑えます。
ナファゾリン塩酸塩	10mg	局所の血管を収縮させ、止血します。
ベンゼトニウム塩化物	10mg	殺菌・消毒作用があり、化膿を防ぎます。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

本品のお問合せは、お買い求めのお店、または次の所へお問合せください。
 森下仁丹株式会社(お問合せ先) ☎0120-181-109
 平日9:00～21:00(土・日・祝日9:00～17:00)

副作用被害救済制度のお問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

1502-AHI

森下仁丹株式会社
 発売元 大阪市中央区玉造1丁目2番40号
<http://www.jintan.co.jp>

製造販売元 株式会社 雪の元 本店
 奈良県橿原市大谷町182番地

②DI