



外用殺菌  
消毒薬

# 新レブメント-FN



第2類医薬品

内容量  
150mL

新レブメント-FN

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 患部が広範囲の人
  - 深い傷やひどいやけどの人

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒。
- 痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒。

用法・用量

1日数回ガーゼ・脱脂綿等に浸して塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。

なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

- (3)外用にのみ使用してください。

<ご使用前の注意>

- ★数回、から押ししてください。 ★容器を激しく振らないでください。
- ★先端（噴霧口）を針などで突かないでください。

成分・分量（100mL中）

ベンザルコニウム塩化物・・・0.05g ナファゾリン塩酸塩・・・0.05g  
ジフェニヒドラミン塩酸塩・・・0.50g ジブカイン塩酸塩・・・0.25g  
添加物として、クエン酸、クエン酸Na、炭酸水素Na、香料、pH調整剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをし、立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

使用期限・製造番号は底面に表示

副作用救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

お客様相談室 ☎0570-666-170

この製品は外側を透明フィルムで包んでいます。



4



外装フィルム  
キャップ  
スプレー  
ボトル

JDM8A