

キズリバエース 泡タイプ 80ml

第2類
医薬品 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合
 - ・皮ふ(発疹・発赤、かゆみ、はれ)。又、まれに次の重篤な症状が起こることがあり、その場合は直ちに医師の診療を受けること。
 - ・ショック(使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる)。
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能又は効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

1 日数回、患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿などに浸して塗布する。

 用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

成分・分量(80ml 中)

ジブカイン塩酸塩 80mg, ナファゾリン塩酸塩 80mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩 160mg,
ベンザルコニウム塩化物 80mg, 添加物として香料を含有する 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)

お問い合わせ先
製造販売業者**共立薬品工業株式会社**
奈良県高市郡高取町清水谷 1085 番地
お客さま相談室 ☎0744-52-4741
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝を除く)副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931(フリーダイヤル)