

ハイバンド EX

第3類
医薬品 使用上の注意 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること
本品の使用後又は使用中、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法・用量

布の部分を患部に当て貼付する。

 ＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- (3) 長時間貼付したり、急激にはがしたりしないこと。(皮膚刺激の発生原因になります)
- (4) 刺激に弱い目の周囲、顔面等やわらかい皮膚面には注意して使用すること。
- (5) 粘着面を患部に貼らないこと。

成分・分量

有孔ポリフィルム付不織布 100g(0.909 m²)中にベンザルコニウム塩化物 100mg を含有

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 患部に石けんが残っていると殺菌・消毒効果が低下するので、充分水で洗い流した後、よくふき取ってから使用すること。

お問い合わせ先
製造販売業者

共立薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷 1085 番地

お客さま相談室 ☎0744-52-4741

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎0120-149-931(フリーダイヤル)