

日本標準商品分類番号
872619
承認番号 20700AP200784000
販売開始 1997年12月

2012年4月改訂(記載要領変更に伴う改訂等)  
貯法:室温保存  
火気厳禁、アルコール類 危険等級Ⅱ、水溶性  
注意:保管及び取扱い上の注意の項参照。



キャップ: PP  
ポンプ: PP  
パイプ: PE  
容器: PE  
ラベル: PE

**火気厳禁**

アルコール類 水溶性  
危険等級Ⅱ

希釈しないで原液のままご使用下さい。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



4 987038 971013


使用期限  
製造番号

シルキテン®  
SILKYTEN

速乾性すり込み式 手指・皮膚消毒剤

第3類医薬品

1000mL



アルコール類 水溶性  
危険等級Ⅱ

発売元 株式会社 オーヤラックス  
東京都千代田区麹町1-6-2

製造販売元 小堺製薬株式会社  
東京都墨田区両国4-36-9

第3類医薬品

シルキテン®  
SILKYTEN  
速乾性すり込み式 手指・皮膚消毒剤  
1000mL

シルキテン・Pは、ベンザルコニウム塩化物を有効成分とするエタノール製剤で、迅速な殺菌効果、速乾性を有し、手指・皮膚の保護性に留意した消毒剤です。

本剤のご使用前にこの説明事項を必ずお読みください。

**使用上の注意**

**してはいけないこと**

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります。]

- 局所刺激作用を有するので、塗擦又は清拭するだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して手指・皮膚に貼付しないでください。
- 次の部位には使用しないでください。
  - 損傷のある皮膚
  - 目の周囲、粘膜等

**相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ等

【効能・効果】  
手指・皮膚の殺菌・消毒

【用法・用量】

本品をそのまま手指・皮膚に塗擦するか、又はそのままガーゼ、脱脂綿等に浸して、清拭する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 定められた用法を厳守してください。
- 石鹸類は本剤の殺菌効果を弱めるので、石鹸分を洗い流してから使用してください。
- エタノール製剤の為、皮膚がかさかさする場合がありますので、使い過ぎに注意してください。
- 長期間または広範囲に使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。

【成分】

本品 100mL 中にベンザルコニウム塩化物 0.1g を含有しています。添加物として、エタノール、グリセリン、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 変質、変色を起こすことがあるので適用箇所以外に本液が付着しないように注意してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

**火気厳禁、アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性**

■お問い合わせ先

株式会社 オーヤラックス

学術情報室 電話番号:03(3263)6201

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

株式会社 オーヤラックス

東京都千代田区麹町1-6-2

TEL 03(3263)6201(代表)