

使用期限：

製造番号：

日本薬局方 第2類医薬品

マーキュロクロム液

【外用用殺菌消毒剤】

【外用用殺菌消毒剤】

日本薬局方 第2類医薬品

マーキュロクロム液

Mercurochrome Solution

50mL

マーキュロクロム液「コザカイ・P」

2012年4月改訂（記載要領変更に伴う改訂等）  
この外箱の説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
なお、必要など経絡めるよに大切に保管してください。

▲使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の人には使用しないでください。  
本剤又は水銀製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。  
口唇等の粘膜の部分や目のまわり
3. 広範囲または長期適用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 患部が広範囲の人  
(4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



製造販売元 小堺製薬株式会社  
東京都墨田区両国4-36-9

【外用用殺菌消毒剤】

日本薬局方 第2類医薬品

マーキュロクロム液

Mercurochrome Solution

50mL

マーキュロクロム液「コザカイ・P」

効能・効果

創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回、患部に直接塗布する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 綿棒等に浸してご使用ください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流して下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 定められた用法を厳守してください。
- (6) ヨードチンキ等ヨウ素製剤とは、同時に使用しないでください。

成 分

本品50mL中に、日本薬局方 マーキュロクロム1g含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（原用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 本液で着色すると、脱色しにくいため、必要以外のものに付着しないよう注意してください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigei.html>  
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

（小堺製薬お客様相談窓口）  
電話：03-3631-1495（代表）  
受付時間：9:00～17:00（土日、祝日を除く）



キャップ：PP  
栓：PE  
中 容  
器：PE

RD

