

使用期限：
製造番号：

日本薬局方 第3類医薬品

消毒用エタノール

Ethanol for Disinfection

第3類医薬品

日本薬局方 100mL

消毒用エタノール

Ethanol for Disinfection
消毒用エタノール「コザカイ・P」
(消毒用アルコール)
外皮用殺菌消毒剤

2017年6月改訂

この外箱の説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要なとき認めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります。】

1. 局所刺激作用があるため、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
2. 次の部位には使用しないでください。目の周り、口唇等の粘膜の部分

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ等

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。

第3類医薬品

日本薬局方 100mL

消毒用エタノール

Ethanol for Disinfection
消毒用エタノール「コザカイ・P」
(消毒用アルコール)
外皮用殺菌消毒剤

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用してください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 定められた用法を厳守してください。
- (5) 同一部位にくり返し使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意してください。
- (6) 長期間または広範囲に使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。

成 分

本品100mL中、日本薬局方 エタノール 83mL含有します。[エタノール(C₂H₅O) 76.9～81.4vol%含有。]

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光及び火気を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 変質、変色を起こすおそれがあるので、適用箇所以外に本液が付着しないように注意してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

〈吉田製薬お客様相談室〉
電話：03-3381-2004
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

飲めません 第4類

火気厳禁 アルコール類(エタノール)
水溶性 危険等級Ⅱ

発売元 吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-0

製造販売元 小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9

発売元 吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-0

製造販売元 小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9



紙 外箱

キャップ：PP
容器：PE