

2014年5月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外用殺菌消毒薬
日本薬局方

オキシドール

オキシドール「サンエイ-S」

第3類医薬品



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の部位には使用しないでください。
 - 口唇等の粘膜部分
 - 目の周囲
- 本剤を使用している間は、他の外皮用殺菌消毒剤を使用しないでください。
- 広範囲又は長期間使用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬・化粧品などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 深い傷やひどいやけどの人
- 使用中又は使用後に次の症状があれわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・はれ・かゆみ・発赤

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

◆効能又は効果

傷の消毒・洗浄

◆用法及び用量

そのままの液又は2～3倍にうすめた液を脱脂綿・ガーゼ等に浸して患部を洗う。

《用法及び用量に関する注意》

- ・定められた用法・用量を厳守してください。
- ・顔面など皮膚の敏感な箇所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。
- ・本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- ・小児に使用する時は特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用してください。
- ・目には入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗眼し眼科医の診療を受けてください。
- ・使用部位に他の外用剤を併用しないでください。

◆成分及び分量

本品は過酸化水素 2.5～3.5w/v%を含む

添加物：アセトアニリド

◆保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない冷所（30℃以下）に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけてください。
4. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）

◆包装 100mL、500mL

製造販売元

 **三栄製薬株式会社**
東京都世田谷区北烏山8-1 3-2 3

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)