

## 第2類医薬品

＜殺菌消毒薬＞

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

# かゆみのある傷治療薬 キズカイン<sup>®</sup>

＜早く治つてほしいこんな症状に＞

お肌の乾燥によるかきキズ

虫さされあとのかきむし・かきむしした衣類のゴムの締め付けキズ などに

製品特長

- 「かゆみを鎮める2つの成分※1」と「化膿を防ぐ成分※2」が傷口に浸透し、かゆみのある傷を治します。
- 傷口を保護して治す軟膏タイプです。
- 塗ってもしみにくい油性の基剤です。
- ステロイドは配合していません。

※1：リドカイン、ジフェンヒドラミン  
※2：セトトリミド

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 患部が広範囲の人。
  - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

きり傷、すり傷、かき傷、くつずれ、皮膚の殺菌・消毒

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### 【用法及び用量に関する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 軟膏が手についたまま、目や口の周りなどに触れないようにしてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

## 成分・分量(100g 中)

成 分	分 量	は た ら き
セトトリミド	0.5g	殺菌消毒作用により、化膿を防ぎます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用で、傷口のかゆみや痛みを素早く鎮めます。
ジフェンヒドラミン	0.5g	抗ヒスタミン作用で、傷口のかゆみを抑えます。

添加物としてマイクロクリスタリンワックス、ステアリン酸グリセリン、トリオレイン酸ソルビタン、ワセリンを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温湿の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

発売元  **円平製薬株式会社**

大阪府茨木市宿久庄2丁目7番6号  
お客様相談室 フリーダイヤル(0120)500-461  
9:00~17:00(12:00~13:00、土・日・祝日除く)  
<http://www.tampei.co.jp>

製造  
販売元 **新生薬品株式会社**  
富山県中新川郡上市町横越16番1