

ご使用に際してはこの説明文を必ずお読み下さい

△ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

- 患部及び皮膚に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿に浸して貼付しないこと。
- 次の部位には使用しないこと。
口唇等の粘膜の部分、口の中、目のまわり。
- マーキュロクロム液と同時に使用しないこと。
- 皮膚炎を起こすことがあるので、広範囲又は長期間使用しないこと。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- 医師の治療を受けている人。●本人又は家族がアレルギー体質の人。
- 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。●患部が広範囲の人。
- 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1) 使用後、発疹・発赤、はれ、かゆみ、灼熱感、水泡等皮ふに異常を感じた場合。
まれに下記の重篤な症状がおきことがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

その他の注意

化膿にはかえって症状を悪化させがあるので、
使用に際しては注意すること。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931



効能・効果

創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

適量を1日数回患部に塗布する。

〈用法・用量に関する注意〉

- 定められた用法を厳守すること。
- 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。

成分・分量

100mL中
ヨウ素 3g

添加物として八アセチル化しょ糖変性アルコール、ヨウ化カリウムを含む。

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい場所に密栓して保管すること。
- 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないこと。

火気厳禁 アルコール類、危険等級II、水溶性



ラベル



キャップ
フィルム



製造
番号

使用
期限