

**【効能・効果】**

傷の消毒・洗浄

**【用法・用量】**

そのままの液または2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗う。

**<用法・用量に関連する注意>**

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)顔面など皮膚の敏感な箇所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。
- (5)外用にのみ使用すること。

**【成分・分量】**過酸化水素(H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) 2.5～3.5w/v%

添加物：フェナセチン

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光のあたらない冷所(30℃以下)に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因となったり品質が変わることがある。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5)保存中に容器内の圧力が高くなっていることがありますので、容器の口を顔に向けないようにしてキャップをあけること。

製造販売元 昭和製薬株式会社

大阪府守口市南寺方東通1-4-12

お問い合わせ先：電話 06-6996-5111

販売名：オキシドール「昭和」P

第3類医薬品

TRADE  MARK

日本薬局方

オキシドール

販売名：オキシドール「昭和」P

第3類医薬品

500mL

昭和製薬株式会社

大阪府守口市南寺方東通1-4-12

**⚠【使用上の注意】**

- ⊗** **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
長期連用しないこと。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4)患部が広範囲の人。
  - (5)深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

副作用被害救済制度：0120-149-931

&lt;貯法&gt; 気密容器。遮光して30℃以下で保存。

ボトル  
キャップ  
フィルム

ラベル



4 950498 120819