

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと。
口唇等の粘膜部分、目や目の周囲



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

◆ 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 火気に近づけないこと。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

火気厳禁 危険等級Ⅱ 水溶性
アルコール類

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931



4 950498 280735

TRADE MARK



外用殺菌消毒剤

消毒用 エタノールS

第3類医薬品

10L

昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

◆ 効能・効果
創傷面の殺菌・消毒

◆ 用法・用量
本液を脱脂綿、ガーゼなどに浸して患部に軽く塗る。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚あれを起こすことがある。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (7) 外用にのみ使用すること。

◆ 成分・分量
エタノール 76.9 ~ 81.4 vol%
添加物として微量のハアセチル
しよ糖を含有する。

〈お問い合わせ〉

電話 06-6996-5111
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



ボトル
キャップ



紙
ラベル