

【成分・分量】 ベンザルコニウム塩化物 10w/v%

【効能・効果】

手指、創傷面の殺菌・消毒  
口腔内の殺菌・消毒

【用法・用量】

本品を次のように水で希釈して、塗布又は洗浄する。  
手指の殺菌消毒：ベンザルコニウム塩化物として0.05～0.1%  
創傷面の殺菌消毒：ベンザルコニウム塩化物として0.01～0.025%  
含嗽の場合：ベンザルコニウム塩化物として0.005～0.01%

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を守ること。
- 原液又は濃厚液が皮ふに付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐ水で洗い流すこと。
- 原液又は濃厚液が目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。
- 外用にのみ使用し、内服しないこと。

※希釈方法 キャップに本品をいっぱいまで入れ(1杯は約5mL)、次の通りすすめる。

希釈倍率	0.2%	0.1%	0.05%	0.025%	0.02%	0.01%
本品(キャップではかる量)	4杯	2杯	1杯	1杯	2杯	1杯
加える水の量	1L	1L	1L	2L	5L	5L

お問い合わせ 昭和製薬株式会社 TEL 06-6996-5111  
受付時間 9時から17時まで(土・日・祝日を除く)

TRADE MARK



薄めて使用すること

日本薬局方 10w/v%

ベンザルコニウム塩化物液

販売名：塩化ベンザルコニウム液「昭和」P

(逆性石けん液)

第3類医薬品

500mL

昭和製薬株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

⚠️【使用上の注意】

してはいけないこと ❌

- 【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる】
- 原液のまま使用しない。
  - 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないこと。

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1) 今までに薬や化粧品によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことが人。  
(2) 創傷面が広範囲の人あるいは深い傷やひどいやけどの人。  
(3) 医師の治療を受けている人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ等

- 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

