

TRADE MARK



ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

2014年5月 記載要領変更に伴う改訂

希ヨードチンキ「タイセイ」P

外用殺菌消毒剤

第3類医薬品

日本薬局方

希ヨードチンキ
「タイセイ」P

Dilute Iodine Tincture

500mL

製造販売元
大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり副作用
が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
口唇等の粘膜の部分、口の中、目のまわり、化膿している患部。
3. 広範囲又は長期間使用しないこと

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 患部が広範囲な人。
(4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状が現れた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能効果】

創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

適量を1日数回患部に塗布する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

本品 100mL 中ヨウ素 3g を含有する。

添加物としてヨウ化カリウム、エタノールを含有する。

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、あるいは下記にお願いいたします。
大成薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0942-53-4662(代表) 9:00～17:00(土日・祝日は除く)

使用期限

製造番号

キャップ:PP
本体:ガラス



4 987297 304218

LM14001