



ベンザルコニウム塩化物液10W/V%「タイセイ」P

日本標準商品分類番号 872616

外用殺菌消毒剤

日本薬局方

第3類医薬品

ベンザルコニウム塩化物液 10W/V%「タイセイ」P

Benzalkonium Chloride Solution

(逆性石ケン液)

10%

500mL

製造販売元
大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

必ずうすめて使用すること

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また必要ときに読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

- してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
顔面、陰股部(陰のう等)
- 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 1) 医師の診療を受けている人。
 - 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 3) 患部が広範囲な人。
 - 4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可
能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること



本体:PE
キャップ:PP

使用期限

製造番号

【効能・効果】

手指・創傷面の殺菌・消毒、口くう内の殺菌・消毒

【用法・用量】

本品を次のように水で希釈して、塗布または洗浄
する。

- (1) 手指の殺菌消毒(本品の100~200倍液)
ベンザルコニウム塩化物として0.05%~0.1%
- (2) 創傷面の殺菌消毒(本品の400~1000倍液)
ベンザルコニウム塩化物として0.01%~0.025%
- (3) 含嗽(うがい)の場合(本品の1000~2000倍液)
ベンザルコニウム塩化物として0.005%~0.01%

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等
に浸して貼付しないこと。
- (2) そのままの液または濃厚液が皮ふに付着した場
合は、炎症を起こすことがあるので、すぐ水で洗
い流すこと。
- (3) 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の
指導監督のもとに使用すること。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入
った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受け
ること。
- (5) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石け
ん分を洗い流してから使用すること。
- (6) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

100mL中 日本薬局方ベンザルコニウム塩
化物10g

〈成分・分量に関する注意〉

- (1) 皮革製品に付着した場合は、変質させる
ことがあるので注意すること。
- (2) 染色した布地は、退色することがあるの
で注意すること。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、涼しいところに
密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管するこ
と。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)

本品についてのお問い合わせは、お買い求め
のお店、あるいは下記にお願いたします。
大成薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0942-53-4662 (代表)
9:00~17:00 (土日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 987297 304140

L160415 8124