

TRADE



MARK

殺菌消毒薬

第3類医薬品

日本薬局方
イソプロパノール
 「東海」(AP)
 Isopropanol
 500mL

製造番号

使用期限

製造販売元

東海製薬株式会社

名古屋市中川区江松一丁目105

お客様相談室 ☎ 052-302-8501

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

粘膜(口唇等)、目の周囲、損傷皮膚

▢ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3) 患部が広範囲の人

(4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

アルコール類 火気厳禁、危険等級Ⅱ、水溶性

【効能・効果】

手指・皮膚の殺菌・消毒

【用法・用量】

本液を50~70%に希釈し、脱脂綿、ガーゼなどに浸し患部に使用する。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがある。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (6) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (7) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

イソプロパノール(C₃H₈O) 99vol%以上を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (6) 薬剤が床や家具等に付着しないようにすること。
(変質又は変色のおそれがある。)

キャップ: PP
 ポット: PE
 外装フィルム: PVC

副作用被害救済制度
 ☎: 0120-149-931



4