



外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

# 塩化ベンザルコニウム液(10%) 「東海」(AP)

日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液  
Benzalkonium Chloride Solution  
(逆性石けん液) 500mL

**うすめて使用**

製造番号

使用期限

製造販売元

**東海製薬株式会社**  
名古屋市中川区江松一丁目105

お客様相談室 ☎ 052-302-8501

**⚠ 使用上の注意**

**☒ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

- 1.次の部位には使用しないこと  
顔面、陰股部（陰のう等）
- 2.原液のまま使用しないこと

**相談すること**

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3) 患部が広範囲の人

(4) 深い傷やひどいやけどの人

- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

- 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
〔創傷面の殺菌消毒、含嗽（うがい）〕

**【成分・分量】**

塩化ベンザルコニウムの10w/v%水溶液である。

**【効能・効果】** 手指・創傷面の殺菌・消毒、口腔内の殺菌・消毒

**【用法・用量】** 本品を次のように水で希釈して、塗布または洗浄する。

**手指の殺菌消毒** 塩化ベンザルコニウムとして0.05~0.1%  
(本品の100~200倍液)

**創傷面の殺菌消毒** 塩化ベンザルコニウムとして0.01~0.025%  
(本品の400~1000倍液)

**含嗽（うがい）の場合** 塩化ベンザルコニウムとして0.005~0.01%  
(本品の1000~2000倍液)

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないこと。
- (3) 原液又は濃厚液が皮ふに付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐに水で洗い流すこと。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (6) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。
- (7) 外用にのみ使用すること。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

キャップ ブルートライル PVC  
ボトル フィルム PVC

副作用被害救済制度  
番号:0120-149-931



4