



殺菌消毒薬

第3類医薬品

日本薬局方
希ヨードチンキ
 「東海」(AP)
 Dilute Iodine Tincture
 500mL

製造番号

使用期限

製造販売元

東海製薬株式会社

名古屋市中川区江松一丁目105

お客様相談室 ☎ 052-302-8501

△ 使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人には使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないこと

粘膜(口唇等)、口の中、目の周囲、化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、次の医薬品を使用しないこと

マーキュロクロム液

4. 広範囲又は長期連用しないこと

⌚ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 脊	発疹・発赤、かゆみ、灼熱感、水ぶくれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシ様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

適量を1日数回患部に塗布する。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 患部及び皮膚に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないこと。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用されること。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

100mL中 ヨウ素3g含有
 添加物：ヨウ化カリウム、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

キャップ:PP
 中瓶:PE
 フタ:PE
 フルム:PVC

副用被救済制度
 ☎ 0120-149-9311



4