



外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

ベンザルコニウム塩化物液 10%「東海」(AP)

日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

Benzalkonium Chloride Solution

(逆性石けん液) 500mL

うすめて使用

製造番号

使用期限

製造販売元

東海製薬株式会社
名古屋市中川区江松一丁目105

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと
顔面、陰股部(陰のう等)
2. 原液のまま使用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
〔創傷面の殺菌消毒、含嗽(うがい)〕

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【成分・分量】

ベンザルコニウム塩化物の10w/v%水溶液である。

【効能・効果】手指・創傷面の殺菌・消毒、口腔内の殺菌・消毒

【用法・用量】本品を次のように水で希釈して、塗布または洗浄する。

手指の殺菌消毒 ベンザルコニウム塩化物として0.05~0.1%
(本品の100~200倍液)

創傷面の殺菌消毒 ベンザルコニウム塩化物として0.01~0.025%
(本品の400~1000倍液)

含嗽(うがい)の場合 ベンザルコニウム塩化物として0.005~0.01%
(本品の1000~2000倍液)

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないこと。
- (3) 原液又は濃厚液が皮ふに付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐに水で洗い流すこと。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (6) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。
- (7) 外用にのみ使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

お客様相談室 ☎ 052-302-8501

PP
PE
PE
PVC
キャット
ボルト
キボ
外装フィルム



副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



4 987394 105022