



第3類医薬品

*2014年10月改訂

ご使用前にラベルをよく読み正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるよう保管して下さい。

殺菌消毒剤

日本薬局方

ベンザルコニウム塩化物液 クレミール(サンケミファ)

(逆性石ケン液) 10w/v%

必ずうすめて使用すること

【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

- 原液のまま使用しないこと。
- 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿に浸して貼付しないこと。

* ☐ 相談すること

1.次的人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 患部が広範囲の人。
- 深い傷やひどいやけどの人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ等

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

【效能・効果】

- 手指の殺菌・消毒 ○創傷面の殺菌・消毒
- 口腔内の殺菌・消毒

【用法・用量】

本剤を次のように水で希釈して、塗布又は洗浄する。

○手指の殺菌・消毒の場合：ベンザルコニウム塩化物として0.05~0.1%（本剤の100~200倍液）

○創傷面の殺菌・消毒の場合：ベンザルコニウム塩化物として0.01~0.025%（本剤の400~1,000倍液）

○含嗽の場合：ベンザルコニウム塩化物として0.005~0.01%（本剤の1,000~2,000倍液）

<希釈方法> 本剤のキャップ1杯は約5mLです。

100倍溶液…本剤キャップ2杯を水1Lに溶かす。

200倍溶液…本剤キャップ1杯を水1Lに溶かす。

【用法・用量に関する注意】

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。

2. 原液又は濃厚液が目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

3. 外用にのみ使用し、内服しないこと。

4. 定められた用法・用量を厳守すること。

5. 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。

6. 皮革製品に付着した場合は、変質させることがあるので注意すること。

7. 染色した布地は退色があるので注意すること。

8. 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐ水で洗い流すこと。

【成分・分量】

本剤は100mL中に日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物10gを含有する。(ベンザルコニウム塩化物 10w/v%水溶液)

【保管及び取り扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。

2.小児の手の届かない所に保管すること。

3.他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になります。品質が変わることがある。)

4.使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【その他の公衆衛生・家庭衛生分野での使用法】

1.食器・器具類の消毒

茶碗、皿、コップ、ナイフ、包丁類、調理器具等は水洗いした後、本剤の200~500倍液に5分間以上浸した後水洗いする。

2.家屋・乗物等の消毒

床、畳、家具、調度品、手洗い場、浴槽、便所、座席、手すり、電話機等は本剤の200~500倍液で清拭するか又は噴霧する。

3.ごみ箱、冷蔵庫の消毒

本剤の100~200倍液を噴霧する。

4.その他

食品工場、清涼飲料水工場、缶詰・製菓工場の施設、器具の消毒には本剤の200~500倍液を用いる。

サンケミファ株式会社 お客様相談窓口

電話 (022) 394-3031

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

○○ サンケミファ株式会社

仙台市青葉区芋沢字大竹新田 8-1

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

製造番号

使用期限

JAN

987468104173

4

キャップ: PP
ボトル: PE
ラベル: PP

500mL