



第3類医薬品

日本薬局方

消毒用エタノール

日本薬局方

消毒用エタノール

*2014年10月改訂

ご使用前にラベルをよく読み正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるよう保管して下さい。

日本薬局方

消毒用エタノール

(サンケミファ)

* ⚠【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 軽く塗るだけにとどめ、脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に貼付しないこと。
 2. 次の部位には使用しないこと。
目の周り、口唇等の粘膜の部分(局所刺激作用があるため。)

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ等

3.5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】本剤を脱脂綿、ガーゼ等に浸して、患部に軽く塗る。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (4) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (5) 同一部位に繰り返し使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (6) 長期間又は広範囲に使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

【成分・分量】本剤はエタノール(C₂H₆O) 76.9~81.4vol%を含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 火気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はニスを溶かすので、ニスの塗ってある建具や家具等には本剤が付着しないように注意すること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

サンケミファ株式会社 お客様相談窓口

電話 (022) 394-3031 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

サンケミファ株式会社

仙台市青葉区芋沢字大竹新田 8-1

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

第4類・アルコール類

製造番号

水溶性・危険等級Ⅱ

使用期限

火気厳禁

折りたたんで
廃棄しやすい
ボトルを採用



溝のある方をつぶす。



溝にそってたたむと
きちんとたためて
空気も入りません。

つぶせるボトルなので
寒冷時には、へこみ等、
変形することがありま
すが品質には変わりな
くお使いいただけます。

JAN



4



キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PP

500mL