

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外用消毒剤

第3類医薬品

スワブステイック エタノール

(綿棒付 IPA添加消毒用エタノール製剤)

* 【特徴】

本品は、薬剤（IPA添加消毒用エタノール）と綿棒を別々の区画に包装した完全個包装の消毒剤です。使用する直前に、薬剤を綿棒にしみ込ませて使用します。個包装のため携帯に便利です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)
次の部位には使用しないでください。
(1)損傷のある皮ふ
(2)目の周囲、粘膜等



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関連部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |

その他の注意

本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがあります。

【成分・分量】

有効成分 100mL中エタノールを83mL (76.9~81.4vol%)
含有
添加物としてイソプロパノールを3.7mL (3.7vol%)
含有

液量 3.0mL

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

本剤を付属の綿棒で、塗擦、清浄用として用いる。

〈用法・用量に連する注意〉

- 1) 本剤は外用にのみ使用してください。
- 2) 本剤は、1包につき1回の使用とし、内包装を開封後はできるだけ速やかにお使いください。
- 3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 4) 過度に使用すると脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意してください。
- 5) 定められた用法・用量を厳守してください。
- 6) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。


【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) ほかの容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 火気には近づけないでください。

【包装】

M : 60包入

【使用方法】



【製造販売元の氏名又は名称及び住所】

製造販売元 リバテープ製薬株式会社

〒861-0136

熊本県熊本市北区植木町岩野45番地

電話 096 (272) 0691

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)