

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

外用消毒剤

第2類医薬品

スワブスティック ヘキシジン

(綿棒付0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩製剤)

【特徴】

本品は、薬剤（0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩）と綿棒を別々の区画に包装した完全個包装の消毒剤です。使用する直前に、薬剤を綿棒にしみ込ませて使用します。個包装のため携帯に便利です。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどい火傷の人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関連部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 本剤は、本体及び外箱に表示されてある使用方法に従って、使用してください。
- 2) 本剤は、1包につき1回の使用とし、内包装を開封後はできるだけ速やかにお使いください。
- 3) 本剤は外用だけに使用し、内服、うがいや口腔等の粘膜の殺菌・消毒には使用しないでください。
- 4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 5) 定められた用法・用量を厳守してください。
- 6) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 7) 含浸後は速やかにご使用ください。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) ほかの容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】

- S : 60包入
 S2本入 : 60包入
 M : 60包入

【使用方法】

<p>① 図の部分を押さえる。</p>	<p>② 液が入っている部分をつまむ様にしぼりだす。(山折り)</p> <p>※本体を折り曲げないでください。</p>
<p>③ 綿棒に液がしみこむのを確認する。薬液残りがあれば2、3回プッシュする。</p>	<p>④ 反対側の矢印部分から線部分まではがし、綿棒をとりだす。</p>

※【消費者相談窓口】

リバテープ製薬株式会社 メディカル営業部
 〒861-0136
 熊本県熊本市北区植木町岩野45番地
 電話 096 (272) 0691

【製造販売元の氏名又は名称及び住所】

製造販売元 リバテープ製薬株式会社
 〒861-0136
 熊本県熊本市北区植木町岩野45番地
 電話 096 (272) 0691

【成分・分量】

有効成分 100mL中クロルヘキシジングルコン酸塩液
 (20%) を0.25mL含有
 液量 S : 1.6mL
 S2本入 : 3.3mL
 M : 3.0mL

【効能・効果】

すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

本剤を付属の綿棒を用いて、1日数回患部に塗布してください。

※ 副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)