

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外用消毒剤

第 3 類医薬品

10%ポビドンヨードP外用液

【特徴】

本剤は個包装で使いきりの外用消毒剤です。

【△ 使用上の注意】**☒ してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります）

次の人には使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

■ 相談すること**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

- （1）医師の治療を受けている人
- （2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- （3）患部が広範囲の人
- （4）深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック （アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6 日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**【効能・効果】**

きり傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけど等の患部の殺菌・消毒
とびひ、おでき等の感染皮膚面の殺菌・消毒

【用法・用量】

1 日数回患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- （2）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- （3）大量かつ長時間の接触によって、接触性皮膚炎、皮膚変色があることがあるので、溶液の状態では長時間皮膚と接触させないでください。
- （4）石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用してください。
- （5）外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

有効成分：1mL 中ポビドンヨード 100mg（有効ヨウ素として 10mg）含有

添加物：濃グリセリン、ラウロマクロゴール、無水クエン酸、無水リン酸一水素ナトリウム、ヨウ化カリウム、pH 調整剤

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- （2）小児の手の届かないところに保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えて保管しないでください。
- （4）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- （5）開封後は速やかに使用してください。

【包装】

15mL

製造販売元 リバテープ製薬株式会社

〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野 45 番地

電話番号 096-272-0691

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）